



Partij voor de Dieren

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

MOTIE VREEMD De Amerikaanse rivierkreeft als indicator voor ecosysteemherstel

De algemeen bestuursleden van Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard in vergadering bijeen op 7 oktober 2026, te Rotterdam,

Constaterende dat:

- Het DB in de Commissie IWB een VV voorstel heeft voorgelegd waarover een richtinggevend besluit wordt gevraagd;
- Aan VV leden wordt voorgesteld een motie vreemd in te dienen met een richtinggevend voorstel met aandacht voor het type maatregelen; voorkeursaanpak qua gebieden; de wijze van dekking van de kosten en hoogte van de bijdrage van het hoogheemraadschap;
- Het VV voorstel het maatregel plus scenario 2 omvat, waarin extra ecosysteemherstel mogelijkheden worden voorgesteld, die wij van harte ondersteunen.

Overwegende dat:

Wegvangen niet zal leiden tot een structureel kleinere populatie, maar wel tot structurele kosten:

- In een recent artikel wordt aangegeven dat al veel proeven zijn gedaan met wegvangen, maar dit averechts lijkt te werken. Als redenen worden gegeven dat de grotere rivierkreeften de kleinere eten; en hogere vangdruk leidt tot voortplanting op jongere leeftijd.
- Zodra het wegvangen stopt, herstelt een populatie zich meestal binnen twee jaar volledig.¹

Praktijkproeven met natuurvriendelijke, geleidelijk aflopende oevers, wel positief effect sorteren.

- Op een proeflocatie in Polderpark Cronesteyn in Leiden daalde het aantal Amerikaanse rivierkreeften van ongeveer 8,5 naar 0,5 rivierkreeften per vierkante meter.² Wel wordt in het eerder genoemde artikel geconstateerd dat de omstandigheden op succesvolle proeflocaties, te weten een relatief hoog zandgehalte van ongeveer 55 procent op het veen, bijdroegen aan het succes.

¹ <https://www.melkveebedrijf.nl/duurzaam-ondernemen/aangepaste-oever-kan-helpen-in-strijd-tegen-hardnekkige-rivierkreeft/>

² <https://www.omroepwest.nl/natuur/5148947/rivierkreeften-flink-teruggedrongen-nu-moeten-de-waterplanten-terugkeren>

Een nieuw natuurlijk evenwicht zou kunnen ontstaan bij een voldoende hoog gehalte van nieuwe natuurlijke vijanden.

- De rivierkreeften worden inmiddels gegeten door een groeiend aantal dieren, zoals de fuut, de meerkoet, de blauwe reigen, de zilverreiger, otter, paling en snoek.
- De paling voorheen in de Krimpenerwaard, het deel van het gebied van HHSK waar de Amerikaanse rivierkreeft veel voorkomt volop aanwezig. Door visserij en hindernissen in het water is dit aantal sterk afgenomen.
- De inzet van HHSK op een paling-otterlandschap biedt goede hoop op een toename van deze diersoorten.

Verzoekt het college:

- Te kiezen voor continuering van inzet op ecosysteemherstel en waar zich kansen voordoen de kosten ten laste te brengen van de begroting;
- Experts te vragen de VV te komen informeren over de kansen en onmogelijkheden;
- De keuze voor maatregelen te koppelen aan de ontwikkeling van een duurzaam toekomstperspectief van de Krimpenerwaard.

En gaat over tot de orde van de dag.



Tommy Ventevogel



Linda Jansen



Jaap Rozema